

ALTIMYCIN AEROSOL*

ANTIBIÓTICO EN AEROSOL
Oxitetraciclina Clorhidrato

Número de Registro: Q-7654-020
Reg. PANAMÁ RF-3147-15
Reg. NICARAGUA 7571



FÓRMULA



Cada 1 ml. **ALTIMYCIN* AEROSOL** contiene:

Oxitetraciclina Clorhidrato Ph. Eur. **5 g.**

(Equivalente a 3.6 % p/p)

Vehículo c.b.p. **140 g.**

DESCRIPCIÓN



ALTIMYCIN AEROSOL* es una solución en spray de color azul que contiene Oxitetraciclina (clorhidrato), un antibiótico que pertenece al grupo de las tetraciclinas obtenido a partir del actinomiceto *Streptomyces rimosus* y azul patente V, un colorante hidrosoluble que funciona como marcador.

La adición de un colorante facilita el reconocimiento de los animales que han sido tratados y así monitorearlos e identificar casos nuevos.

ALTIMYCIN AEROSOL***MECANISMO DE ACCIÓN**

La Oxitetraciclina es un antibiótico bacteriostático que inhibe la síntesis de proteínas en bacterias susceptibles. Dentro de la célula, se une irreversiblemente a los receptores de la subunidad 30s en los ribosomas bacterianos donde interfiere con la unión de la aminoacil-transferasa del RNA en el sitio de unión del complejo RNA mensajero.

FARMACOCINÉTICA

En tratamientos tópicos, la Oxitetraciclina penetra de manera suficiente en el área afectada teniendo una terapia efectiva. Ya que la concentración en la presentación en aerosol es mayor a la de la solución inyectable, la solución provee altos niveles de principio activo disponibles en el área afectada.

INDICACIONES

ALTIMCYN AEROSOL* está indicado para el tratamiento de garrro y de infecciones tópicas en bovinos, equinos, ovinos, caprinos, porcinos y caninos, causadas por organismos sensibles a la Oxitetraciclina. Actúa contra bacterias Gram-positivas y Gram-negativas y algunos patógenos que comúnmente no son afectados por otros antibióticos como las rickettsias, clamidias, virus grandes, micoplasmas, espiroquetas y actinomicetos.

DOSIS

Las heridas deben ser limpiadas previamente. Agitarse bien antes de usarse, aplique el producto a una distancia de 10 a 15 centímetros de distancia sobre la herida por unos segundos hasta que esté cubierta en su totalidad.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Únicamente por vía tópica.

PRESENTACIÓN

Lata presurizada de 140 g.



ALTIMYCIN AEROSOL*

ADVERTENCIAS



- No administrar en equinos destinados para consumo humano.
- A los ovinos tratados se les debe de permitir pararse en piso seco por una hora antes de regresar al pasto.
- Para el tratamiento de pododermatitis, los cascos deberán ser limpiados y rebajados antes de la administración.
- Mantenga alejado de los ojos.
- Evite el contacto con la piel.
- Lave las manos después de usarse.
- Evite inhalar los vapores.
- Envase presurizado.
- No perforo o queme, aun después de usado.
- No lo rocíe sobre una flama descubierta o cualquier material incandescente.
- Debe ser usado en un área bien ventilada.
- No fumar mientras se usa este producto.
- Altamente inflamable.

PRECAUCIONES



- Consérvese en lugar fresco y seco.
- Protéjase de la luz.
- Mantenga fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO

USO VETERINARIO

ELABORADO EN EL REINO UNIDO

**IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:
ANIMAL CARE PRODUCTS S.A. DE C.V.**

Animal Care Products S.A. de C.V. / ACP990511LF9

Manuel Gómez Morín No. 3870, Int.301 Col. Centro Sur, C.P. 76090, Querétaro, Qro., México



+52 (442) 215 1980



ventas@animalcare-inc.com



animalcare-inc.com