

BENROL*

ENROFLOXACINA AL 10%
Solución Inyectable

Número de Registro: Q-7654-073
Reg. PANAMÁ RF-5667-11



FÓRMULA



Cada 100 ml. de **BENROL***
contienen:

| | |
|-----------------|----------------|
| Enrofloxacin | 10 g. |
| Vehículo c.b.p. | 100 ml. |

DESCRIPCIÓN



BENROL* es un producto inyectable elaborado a base de Enrofloxacin, un antimicrobiano de amplio espectro del grupo de las fluorquinolonas de tercera generacin. Su accin bactericida es de gran ayuda en el tratamiento de una amplia variedad de infecciones dérmicas, respiratorias, urinarias e intestinales ocasionadas por organismos Gram-positivos, Gram-negativos y Micoplasmas.

BENROL***MECANISMO DE ACCIÓN**

La farmacodinamia de este antibiótico (concentración-dependiente) consiste en:

- Inhibición de la DNAgirasa.
- Bloquea la reproducción bacteriana.
- Bloquea la reparación bacteriana.
- Tiene un efecto bactericida a dos veces la concentración mínima inhibitoria.
- Destruye directamente el RNA.
- Tiene una tasa muy baja de resistencia.

La Enrofloxacin tiene un amplio espectro contra organismos Gram-positivos y Gram-negativos. Es eficaz en el tratamiento contra algunas especies de *Pseudomonas*, *Mycoplasma* (*Mycoplasma gallisepticum*), *Salmonella arizonae*, *E. coli*, *Campylobacter sp.*, *Chlamydia sp.*, *Ureaplasma sp.*, *Legionella sp.*, *Pasteurella sp.*, *Haemophilus sp.*, *Mycobacterium sp.*, *Staphylococcus sp.*, *Brucella sp.*, *Rickettsia sp.*, *Coxiella burnetii*, *Plasmodium falciparum*, *Streptococcus sp.*

INDICACIONES

BENROL*, está indicado en el tratamiento de enfermedades infecciosas respiratorias, digestivas, genitales, o septicemias; causadas por bacterias Gram-positivas, Gram-negativas, y Micoplasmas, en bovinos (productores de leche y carne), caninos y felinos domésticos.

DOSIS

Bovinos (productores de leche y carne): 1 ml. por cada 40 kg. de peso (equivalente a 2.5 mg. de Enrofloxacin por kg. de peso), cada 24 horas por 3-5 días consecutivos.

Caninos y felinos (domésticos): 1 ml. por cada 20 kg. de peso (equivalente a 5 mg. de Enrofloxacin por kg. de peso), cada 24 horas por 3-5 días consecutivos.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Intramuscular, Intravenosa, Intrauterina (5 ml. de **BENROL*** en 80 - 100 ml. de solución salina fisiológica estéril).

PRESENTACIÓN

Frasco de 20 ml., 100 ml. y 250 ml.



BENROL*

ADVERTENCIAS



- No administrar más de 10 ml. en el mismo sitio de inyección.
- Suspender la medicación 28 días antes del sacrificio de los animales destinados al consumo humano.
- No utilizar para consumo humano la leche de animales tratados hasta 5 días posteriores a la aplicación.

PRECAUCIONES



- Consérvese en lugar fresco y seco.
- Protéjase de la luz solar directa.
- Mantenga fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA.

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.

**HECHO EN MÉXICO PARA:
ANIMAL CARE PRODUCTS S.A. DE C.V.**

Animal Care Products S.A. de C.V. / ACP990511LF9

Manuel Gómez Morín No. 3870, Int.301 Col. Centro Sur, C.P. 76090, Querétaro, Qro., México

 **+52 (442) 215 1980**

 **ventas@animalcare-inc.com**

 **animalcare-inc.com**