

DARTAMOX* 500 PREMIX

ANTIBIÓTICO DE AMPLIO ESPECTRO
EN PREMEZCLA
(Amoxicilina 50%)

Número de Registro: Q-7654-021



FÓRMULA



Cada 1000 g. de
DARTAMOX* 500 PREMIX,
contienen:

Amoxicilina trihidratada
Excipiente c.b.p.

500 g.
1000 g.

DESCRIPCIÓN



La Amoxicilina es un antibiótico semisintético de amplio espectro que pertenece al grupo de las penicilinas; tiene acción bactericida. Su volumen de distribución es mayor al de la Ampicilina, y al igual que ésta, es inactivada por las B-lactamasas.

Está indicada en el tratamiento de las infecciones causadas por una gran variedad de bacterias Gram-negativas y Gram-positivas.

DARTAMOX* 500 PREMIX**MECANISMO DE ACCIÓN**

La Amoxicilina actúa como todas las penicilinas, inhibiendo la síntesis de la pared celular de las bacterias. Su amplio espectro incluye a la mayoría de los gérmenes patógenos, ya sean Gram-positivos o Gram-negativos.

INDICACIONES

DARTAMOX* 500 PREMIX es utilizado para combatir infecciones respiratorias, digestivas y septicémicas causadas por bacterias Gram-positivas y Gram-negativas sensibles a la Amoxicilina; algunas de éstas son:

- Infecciones urogenitales
- Diarreas (*E. coli*, *Salmonella sp.*, *Klebsiella sp.*)
- Neumonías
- Septicemias
- Mastitis
- Metritis
- Pododermatitis
- Artritis
- Ántrax
- Actinomicosis
- Espiroquetosis
- Clostridiasis
- Abscesos por *Corynebacterium sp.*, *Streptococcus sp.*, *Staphylococcus sp.* y algunas especies de *Proteus*.

DOSIS

La dosis recomendada para todas las especies es de 10 a 20 mg./kg. de peso.

Lechones: 400 a 600 g. por tonelada de alimento (equivalente a 200-300 g. de Amoxicilina) durante 5 a 7 días.

Porcinos: 600 a 800 g. por tonelada de alimento (equivalente a 300-400 g. de Amoxicilina) de 5 a 7 días.

Aves (pollo de engorda y pollita de reemplazo): 400 a 800 g. por tonelada de alimento (equivalente a 200-400 g. de Amoxicilina) durante 5 a 7 días.

Becerras lactantes: 600 g. a 1 kg. por tonelada de alimento (equivalente a 300-500 g. de Amoxicilina) durante 10 a 20 días.

Becerras destete: 500 a 700 g. por tonelada de alimento (equivalente a 250-350 g. de Amoxicilina) durante 8 a 15 días.

Engorda: 1.6 a 2.4 kg. por tonelada de alimento (equivalente a 800-1,200 g. de Amoxicilina) durante los primeros 15 a 21 días del inicio del ciclo intensivo de engorda.

DARTAMOX* 500 PREMIX**VÍA DE ADMINISTRACIÓN**

Oral, mezclado en el alimento terminado.

PRESENTACIÓN

Saco de 5 kg.

ADVERTENCIAS

- No administrar este producto 15 días previos al sacrificio de los animales destinados al consumo humano.
- No administrar este producto en aves de postura cuya producción de huevo se destine al consumo humano.
- No administrar este producto a bovinos en producción de leche que se destine al consumo humano.
- No administrar en animales sensibles a las Penicilinas-Cefalosporinas.
- Asegure una distribución uniforme del producto en el alimento terminado. Se recomienda realizar una premezcla con alguno de los ingredientes mayoritarios del alimento, para luego incorporarlo al resto de la ración.
- Se debe de utilizar equipo de protección (guantes, goggles y mascarilla) durante su mezclado.

PRECAUCIONES

- Consérvese en lugar fresco y seco.
- Protéjase de la luz.
- Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA.


CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.

**HECHO EN MÉXICO PARA:
ANIMAL CARE PRODUCTS S.A. DE C.V.**

Animal Care Products S.A. de C.V. / ACP990511LF9

Manuel Gómez Morín No. 3870, Int.301 Col. Centro Sur, C.P. 76090, Querétaro, Qro., México

 **+52 (442) 215 1980**

 **ventas@animalcare-inc.com**

 **animalcare-inc.com**