

## DARTAMOX\* PREMIX

ANTIBIÓTICO DE AMPLIO ESPECTRO  
EN PREMEZCLA  
(Amoxicilina 20%)

Número de Registro: Q-7654-036



### FÓRMULA



Cada 1000 g. de  
**DARTAMOX\* PREMIX** contienen:

Amoxicilina trihidratada	<b>200 g.</b>
Excipiente c.b.p.	<b>1000 g.</b>

### DESCRIPCIÓN



La Amoxicilina es un antibiótico semisintético de amplio espectro que pertenece al grupo de las penicilinas. Tiene una acción bactericida. Su volumen de distribución es mayor al de la Ampicilina, y al igual que ésta, es inactivada por las B-lactamasas.

Está indicada en el tratamiento de las infecciones causadas por una gran variedad de bacterias Gram-negativas y Gram-positivas.

**DARTAMOX\* PREMIX****MECANISMO DE ACCIÓN**

La Amoxicilina actúa como todas las penicilinas, inhibiendo la síntesis de la pared celular de las bacterias. Su amplio espectro incluye a la mayoría de los gérmenes patógenos, ya sean Gram-positivos o Gram-negativos.

**INDICACIONES**

Es utilizada para combatir infecciones en órganos y tejidos causadas por bacterias sensibles a ella; infecciones tales como:

- Infecciones urogenitales
- Diarreas (*E. coli*, *Salmonella s.p.*, *Klebsiella sp.*)
- Neumonías
- Septicemias
- Mastitis
- Metritis
- Pododermatitis
- Artritis
- Ántrax
- Actinomicosis
- Espiroquetosis
- Clostridiosis
- Abscesos por *Corynebacterium sp.*, *Streptococcus sp.*, *Staphylococcus sp.* y algunas especies de *Proteus*.

**ESPECIES**

Porcinos (lechones y adultos), Aves (pollo de engorda y pollita de reemplazo), Becerros (destetados, lactantes, productores de carne y leche).

**DOSIS**

Dosis recomendada para todas las especies es de 10 a 20 mg./kg. de peso.

**Lechones:** 1 a 1.5 kg. por tonelada de alimento durante 5 a 7 días.

**Porcinos:** 1.5 a 2.0 kg. por tonelada de alimento de 5 a 7 días.

**Aves:** 1 a 2 kg. por tonelada de alimento durante 5 a 7 días.

**Becerros lactantes:** 1.5 a 2.5 kg. por tonelada de alimento durante 10 a 20 días.

**Becerros destete:** 1250 a 1800 kg. por tonelada de alimento durante 8 a 15 días.

**Engorda:** 4 a 6 kg. por tonelada de alimento durante los primeros 15 a 21 días del inicio del ciclo intensivo de engorda.

**VÍA DE ADMINISTRACIÓN**

Oral. Mezclado en el alimento terminado.

**DARTAMOX\* PREMIX****PRESENTACIÓN**

Saco de 5 kg.

**ADVERTENCIAS**

- No administrar este producto 15 días previos al sacrificio de los animales destinados al consumo humano.
- No administrar este producto en aves de postura cuya producción de huevo se destine al consumo humano.
- No administrar este producto a bovinos en producción de leche que se destine al consumo humano.
- No administrar en animales sensibles a las Penicilinas-Cefalosporinas.
- Asegure una distribución uniforme del producto en el alimento terminado. Se recomienda realizar una premezcla con alguno de los ingredientes mayoritarios del alimento, para luego incorporarlo al resto de la ración.
- Se debe de utilizar equipo de protección (guantes, goggles y mascarilla) durante su mezclado.

**PRECAUCIONES**

- Consérvese en lugar fresco y seco.
- Protéjase de la luz directa.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.

**SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA.**

**CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.**

**HECHO EN MÉXICO PARA:  
ANIMAL CARE PRODUCTS S.A. DE C.V.**

**Animal Care Products S.A. de C.V. / ACP990511LF9**

Manuel Gómez Morín No. 3870, Int.301 Col. Centro Sur, C.P. 76090, Querétaro, Qro., México



**+52 (442) 215 1980**



**ventas@animalcare-inc.com**



**animalcare-inc.com**