

## FLUNEXIM\*

ANTIINFLAMATORIO, ANALGÉSICO Y  
ANTIPIRÉTICO SOLUCIÓN INYECTABLE  
(Meglumina de Flunixin)

Número de Registro: Q-7654-091



### FÓRMULA



Cada ml. de **FLUNEXIM\***  
contiene:

Meglumina de Flunixin  
(equivalente a 50 mg. de  
Flunixin base)  
Vehículo c.b.p.

**83 mg.**  
**1 ml.**

### DESCRIPCIÓN



**FLUNEXIM\*** es una solución que tiene como principio activo meglumina de flunixin, un antiinflamatorio no esterooidal derivado nicotínico que se conoce por ser un potente analgésico.

**FLUNEXIM\*****MECANISMO DE ACCIÓN**

Los antiinflamatorios no esteroideos (AINE), como es el caso de la meglumina de flunixin, tienen su acción al interferir sobre las ciclooxygenasas (COX), lo que interrumpe la producción de eicosanoides (prostaglandinas, tromboxanos y leucotrienos), los cuales, en conjunto con la histamina, serotonina y bradiquinina, sensibilizan las terminaciones nerviosas periféricas que participan en procesos febriles y son mediadores químicos (junto con otros elementos) de la inflamación.

El dolor normalmente está acompañado de inflamación y daño en los tejidos, resultante de la estimulación local de terminaciones dolorosas por la excitación de neuronas de la médula espinal o de la liberación de prostaglandinas. Los AINE suprimen la síntesis de prostaglandinas en los mecanismos centrales y periféricos.

**INDICACIONES**

**FLUNEXIM\*** es un agente antiinflamatorio, analgésico y antipirético sin ser corticoide ni narcótico; es excelente en el tratamiento de inflamaciones y dolores asociados con alteraciones músculo-esqueléticas e inflamaciones agudas relacionadas con múltiples enfermedades de todas las especies (excepto felinos).

**Bovinos productores de leche y carne:** Se recomienda para diarreas neonatales en terneros, (produciendo un efecto antisecretorio, reduciendo el porcentaje de mortalidad de becerros), en el complejo respiratorio bovino, neumonías, septicemias, mastitis,

Fiebre de embarque, inflamaciones agudas, shock, tratamiento de dolor agudo causado por cirugías, heridas y lesiones del aparato locomotor.

**Equinos:** Dolores viscerales asociados al cólico (su respuesta es en menos de 15 minutos), dolores músculo-esqueléticos, laminitis, miositis, artritis, osteoartritis, tendinitis, sinovitis, osteítis, adecuado en el proceso de mioglobinuria o caballos envarados.

**DOSIS**

La dosis recomendada para todas las especies es de 1.1 a 2.2 mg./kg.

**Bovinos productores de leche y carne:** Administrar 2 ml. por cada 45 kg. de peso corporal (2.2 mg./kg.) cada 12 a 24 horas por un período de 5 días consecutivos.

**Equinos:** Administrar 1 ml. por cada 45 kg. de peso corporal (1.1 mg./kg.) cada 12 a 24 horas de acuerdo a la severidad del caso. El tratamiento puede repetirse por un período de hasta 4 días si reaparecen los síntomas.

**Porcinos:** Administrar 2 ml. por cada 45 kg. de peso corporal (2.2 mg./kg.) cada 12 horas por un período de hasta 2 días.

La dosis, frecuencia y duración pueden variar de acuerdo al criterio del Médico Veterinario.

**FLUNEXIM\*****VÍA DE ADMINISTRACIÓN**

Intramuscular o Intravenosa.

**PRESENTACIÓN**

Frasco de 100 ml. y 250 ml.

**ADVERTENCIAS**

- El tiempo de retiro en animales destinados para consumo humano es de 7 días para bovinos, ovinos y caprinos; en el caso de porcinos es de 21 días.
- La leche para consumo humano podrá ser utilizada 24 horas después de la última aplicación.
- No administrar en animales menores a los 3 días de edad.
- No administrar a Equinos destinados al consumo humano.
- No administrar en Felinos.

- No administrar en animales sensibles al flunixin.
- No mezclar otros medicamentos dentro de la misma jeringa.
- La causa de cólico en equinos deberá ser determinada y tratada paralelamente con la terapia adecuada.
- No exceder la dosis recomendada.
- Evitar la aplicación intra-arterial en equinos, se pueden presentar signos como incoordinación, hiperventilación, histeria, debilidad muscular. Estos signos son pasajeros, se retiraran sin necesidad de tratamiento.

**PRECAUCIONES**

- Consérvese en lugar fresco y seco.
- Protéjase de la luz.
- Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

**SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA.**

**CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.**

**HECHO EN MÉXICO POR:  
ANIMAL CARE PRODUCTS S.A. DE C.V.**

**Animal Care Products S.A. de C.V. / ACP990511LF9**

Manuel Gómez Morín No. 3870, Int.301 Col. Centro Sur, C.P. 76090, Querétaro, Qro., México

 **+52 (442) 215 1980**

 **ventas@animalcare-inc.com**

 **animalcare-inc.com**