

## MATILDEX PREMIX\*

TILMICOSINA FOSFATO  
(Premezcla)

Número de Registro: Q-7654-035



### FÓRMULA



Cada 1000 g. de **MATILDEX PREMIX\***,  
contienen:

Tilmicosina fosfato	<b>200 g.</b>
Excipiente c.b.p.	<b>1000 g.</b>

### DESCRIPCIÓN



**MATILDEX PREMIX\*** es un producto cuyo principio activo es la **Tilmicosina**, un antibiótico perteneciente al grupo de los macrólidos, sintetizado a partir de la tilosina.

**MATILDEX PREMIX\*****MECANISMO DE ACCIÓN**

Los macrólidos son bacteriostáticos, cuyo mecanismo de acción se basa en la inhibición de la síntesis de las proteínas en la bacteria por medio de su unión con la subunidad ribosomal 50s, interfiriendo con complejos para la síntesis de péptidos o reacciones de aminoacil-translocación.

Los fagocitos (monocitos, macrófagos, neutrófilos) son portadores de la tilmicosina. Cuando entran en contacto con las bacterias, la tilmicosina ejerce dos efectos: afecta la síntesis de la proteína bacteriana evitando que el microorganismo se multiplique, y por otro lado, las enzimas lisosomales destruyen a la bacteria.

Su efecto va en función de la concentración alcanzada y no del tiempo.

**INDICACIONES**

**MATILDEX PREMIX\*** se ha aprobado como aditivo de alimentos en porcinos para el control de enfermedades respiratorias asociadas a *Actinobacillus (Haemophilus) pleuropneumoniae* y *Pasteurella multocida*.

Tiene un amplio espectro contra bacterias Gram-positivas, algunas Gram-negativas y micoplasmas, entre ellas: *Mannheimia (Pasteurella) haemolytica*, *Pasteurella multocida*, *Haemophilus somnus*, *Mycoplasma dispar*, *Mycoplasma bovirhinis*, *Mycoplasma gallisepticum*, *Mycoplasma hyopneumoniae*, *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus agalactiae*, *Archanobacter (Corynebacterium, Actinomyces) pyogenes*, *Actinobacillus (Haemophilus) pleuropneumoniae*, *Erysipelothrix rhusiopathiae*, *Moraxella bovis*, *Clostridium perfringens*, *Fusobacterium necrophorum*.

**DOSIS**

Agregar de 1 a 2 kg. de **MATILDEX PREMIX\*** (200 a 400 ppm.) por tonelada de alimento terminado, por un periodo de 2 a 3 semanas.

**MATILDEX PREMIX\*****VÍA DE ADMINISTRACIÓN**

Oral, mezclado con el alimento.

**PRESENTACIÓN**

Saco de 5 kg.

**ADVERTENCIAS**

- No exceder la dosis indicada
- Los animales destinados para consumo humano, deberán sacrificarse 7 días después de la última aplicación.
- No utilizar en animales gestantes y en lactancia.
- No se administre conjuntamente con formulaciones que contengan bentonita, ésta puede disminuir la efectividad de la Tilmicosina.
- Evite el contacto con la piel y mucosas. Use guantes y mascarilla durante la incorporación y manipulación de la premezcla. En caso de contacto con los ojos, lave con agua; si el problema persiste acuda al Médico.

**PRECAUCIONES**

- Consérvese en lugar fresco y seco.
- Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
- Protéjase de la luz.

**SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA.**

**CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.**

**HECHO EN MÉXICO PARA:  
ANIMAL CARE PRODUCTS S.A. DE C.V.**

**Animal Care Products S.A. de C.V. / ACP990511LF9**

Manuel Gómez Morín No. 3870, Int.301 Col. Centro Sur, C.P. 76090, Querétaro, Qro., México



**+52 (442) 215 1980**



**ventas@animalcare-inc.com**



**animalcare-inc.com**